

(5) نهایات اعتيادية.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(ax)}{(ax)^2} = \frac{1}{2} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{ax} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{ax} = 1$$

(6) النهایات والترتيب.

$\lim_{x_0} f(x) = l$ فإن $\begin{cases} x_0 & |f(x) - l| \leq g(x) \\ & \lim_{x_0} g(x) = 0 \end{cases}$ بجوار x_0 (a)

$\lim_{x_0} g(x) = +\infty$ فإن $\begin{cases} x_0 & f(x) \leq g(x) \\ & \lim_{x_0} f(x) = +\infty \end{cases}$ بجوار x_0 (b)

$\lim_{x_0} f(x) = -\infty$ فإن $\begin{cases} x_0 & f(x) \leq g(x) \\ & \lim_{x_0} g(x) = -\infty \end{cases}$ بجوار x_0 (c)

$\lim_{x_0} f(x) = l$ فإن $\begin{cases} x_0 & g(x) \leq f(x) \leq h(x) \\ & \lim_{x_0} g(x) = \lim_{x_0} h(x) = l \end{cases}$ بجوار x_0 (d)

(II) الاتصال(1) تعريف

لكي نبين أن f متصلة في x_0 نقوم بحساب $\lim_{x_0} f(x)$

* تكون f متصلة في x_0 إذا وفقط إذا كانت $\lim_{x_0} f(x) = f(x_0)$

* تكون f متصلة على يمين x_0 إذا وفقط إذا كانت

$$\lim_{x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

* تكون f متصلة على يسار x_0 إذا وفقط إذا كانت

$$\lim_{x_0^-} f(x) = f(x_0)$$

* تكون f متصلة في x_0 إذا وفقط إذا كانت متصلة على يمين و على يسار x_0 .

(2) خصائص

(a) كل دالة حدودية متصلة على IR .

(b) كل دالة جذرية متصلة على حيز تعريفها.

(c) الدوال $x \rightarrow \sin x$ $x \rightarrow \cos x$ متصلة على $x \rightarrow$.

(*) الدال $x \rightarrow \tan x$ متصلة على حيز تعريفها.

(d) إذا كانت f و g دالتين متصلتين على مجال I فإن الدوال

$f + g$ و $f \cdot g$ و αf و $f + g$ متصلة على I .

وإذا كانت g لاتعدم على I فإن $\frac{f}{g}$ متصلة على I .

ملاحظة

إذا كانت f دالة لا تحتوي على الجزء الصحيح وغير معرفة بأجزاء فإنها متصلة على حيز تعريفها لأنها مجموع وجداء دوال متصلة في غالب الأحيان.

(3) التمديد بالاتصال

لتكن f دالة غير معرفة في x_0 ، لكي نبين أن f تقبل تمديدا

بالاتصال في x_0 نقوم بحساب $\lim_{x_0} f(x) = l \in IR$ إذا وجدنا

إن f تقبل تمديدا g بالاتصال في x_0 معرف بما

$$\begin{cases} g(x) = f(x), & x \neq x_0 \\ g(x_0) = l \end{cases} \text{ يلي:}$$

(I) النهایات

$+\infty - \infty$	$\infty \times 0$	$\frac{\infty}{\infty}$	$\frac{0}{0}$
--------------------	-------------------	-------------------------	---------------

(2) العمليات على النهایات الغير منتهية:

$$a \times \infty = \infty \quad (a \neq 0)$$

$$\infty \times \infty = \infty$$

$$0 \times \infty \text{ شغ محمد}$$

$$+\infty + a = +\infty$$

$$-\infty + a = -\infty$$

$$+\infty + \infty = +\infty \quad (a \in \mathbb{R})$$

$$-\infty - \infty = -\infty$$

$$+\infty - \infty \text{ شغ محمد}$$

$$\frac{\infty}{a} = \infty \quad \frac{a}{\infty} = 0 \quad \frac{a \neq 0}{0} = \infty$$

$$\frac{\infty}{\infty} = \frac{0}{0} \text{ شغ محمد}$$

$$(-\infty)^n = \begin{cases} +\infty & \text{sin est paire} \\ -\infty & \text{sin est impaire} \end{cases}$$

$$\sqrt{+\infty} = +\infty$$

(3) خصائص

(a) إذا كانت للدالتين f و g نهاية منتهية في x_0 فإن الدوال $f + g$ و $f \cdot g$ و αf تقبل نهاية منتهية في x_0

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha f(x)) = \alpha \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} \quad \text{فإن } \lim_{x \rightarrow x_0} (g(x)) \neq 0$$

(b) نهاية دالة حدودية في ∞ هي نهاية الحد الأكبر درجة.

(c) نهاية دالة جذرية في ∞ هي نهاية خارج الحدين الأكبر درجة

(4) بعض التقنيات لحساب نهاية دالة لا جذرية:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty \quad \text{التعميل.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + g(x)) = +\infty - \infty \quad (b)$$

(*) إذا كان الحدين الأكبر درجة في كل من $f(x)$ و $g(x)$ متقابلين ← المراافق.

(*) إذا كان الحدين الأكبر درجة في كل من $f(x)$ و $g(x)$ غير متقابلين ← التعويل.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a-a}{0-0} = 0 \quad (c) \quad \text{المرافق.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0+0}{0-0} = 0 \quad (d) \quad \text{التفكيك ثم ربما المراافق.}$$

$$\begin{cases} x = \sqrt{x^2}; x \geq 0 \\ x = -\sqrt{x^2}; x \leq 0 \end{cases} \quad ; \quad \sqrt{x^2} = |x| \quad (e) \quad \text{ملاحظة:}$$

