


## التحكم في تطور المجموعات الكيميائية

**الاسترة السريعة:** تصنيع إستر انطلاقاً من أندريد الحمض الكربوكسلي:

## ١) تعريف الأسترة السريعة:


**مُعادلة التفاعل تكتب كما يلي:**




ويتميز هذا التفاعل بكونه سريع وكلي.

## 2) تطبيقات : تصنيع الأسبيرين:

الأسبيرين (أو حمض الأستيل ساليسيليك) ، إستر مصنع ، انطلاقاً من حمض 2-هيدوكسيبنزويك (أي حمض الساليسيليك) وأندر يد الإشانويك .




ممثل آخر للأسترة السريعة: تصنيع إيثانولات - 3 مثيل بوتيل.



### (3) الحِلْمَةُ الْقَاعِدِيَّةُ لِلْإِسْتَرِ: (تفاعل التصبن)

### **أ) تعريف تفاعل التصبن :**

تؤثر القواعد القوية مثل الصودا والبيوتاس على الاسترات وفق تفاعل تام يسمى تفاعل التصبن معادلة تكتب كما يلى:



= للتفاعل التصفين فائدة كبيرة ، لأنه انطلاقاً من مركبات عضوية طبيعية (الإسترارات) يمكن من الحصول على الكحول والصابون (الصابون كربوكسيلات الصوديوم أو البوتاسيوم).

**ب) تطبيق : تصنف الأجسام الدهنية:**

**الاحماس الذهنية** احماس كربوكسيلية ذات سلسلة غير متفرعة مكونة من عدد زوجي من ذرات الكربون وقد تضم رابطة ثنائية أو أكثر. مثل : حمض اليوتانيويك (حمض الزيدة) :  $C_2H_2 - COOH$  وهو مركب مشبع.

ج. ب. د. د.

$C_3H_7 - COOH$  : حمض البوتانيك (حمض الزبدة)

وهو مركب مشبع.



$$C_{15}H_{31}-COOH :$$

وهو مركب مشبع.

$$C_{17}H_{35}-COOH :$$

غير مشبع (توجد به رابطة ثنائية).

17 35




ويُنتج عن تفاعل حمض دهني  $R-COOH$  مع الغليسيرول  $H-C(OH)-CH_2-CH_2-OH$  ثالثي إستر (أي ثالثي غليسيريد)

$$\begin{array}{c} H \quad C-O-COOR \\ | \\ H_2C-O-COOR \end{array}$$


$$\begin{array}{c} H \quad C-OH \\ | \\ H_2C-OH \end{array}$$

ويفضل استعمال أندرويد ذهني لكي يكون إنتاج هذا الأخير سريعاً وكلياً.

والثلاثي إستر الناتج مركب دهني ، بالتأثير عليه بالصودا نحصل على الصابون:




أو:



**تطبيق:** اكتب معادلة التصبن في حالة

### **ج ) خاصيات الصابون :**

◀ يتمن الصابون بقدرة غاثانية كبيرة لكون الأيونات  $-COO^- - R$  تكون طبقة رقيقة على سطح الماء بحيث تكون الروؤس السالبة منغزة في الماء والذيل بارزة خارج الماء مما يفسر تكون غثاء الصابون فوق الماء.



وبذلك مسحوق الصابون يطرد نحو جدار الاناء ونحو السطح.

▪ عند إضافة قليل من أزرق البروموتيمول إلى محلول الصابون يتضح أنه محلول قاعدي. ويفسر ذلك بوجود أيونات الكربوكسيلات وهي قاعدة ضعيفة.

◀ **الخاصية المنظفة للصابون:** بفضل أيون الكربوكسيلات يتميز الصابون بقدرة كبيرة على إزالة الأوساخ عن السطوح الصلبة.

## II التحكم في تطور مجموعة كيميائية بالحفز:

## (١) مفهوم التحكم في مجموعة كيميائية :

نعلم أن تغيير ترکیز أحد المتفاعلات يمكن من التحكم في تطور مجموعة كيميائية، بحيث يمكن جعل تحول غير كلي ، تحولا كليا و يمكن كذلك التحكم في تطور مجموعة كيميائية بالتأثير على العوامل الحركية (مثل الترکیز البینیة للمتفاعلات و درجة حرارة الوسط التفاعلي والحفاز )، لكن رفع درجة الحرارة عملية مكلفة وقد تؤدي إلى تخريب النواتج ، لذلك يفضل استعمال الحفاز.

## (2) التحكم في تطور مجموعة كيميائية بالاحف:

### **أ) الإبراز التجريبى لأنواع الحفز:**

الحفاز نوع كيميائي انتقائي ونوعي لا يغير حالة التوازن، وإنما يزيد من سرعة التفاعل. فمثلاً باستعمال حفاز يمكن الزيادة من تفكك الماء الأوكسجيني الذي يمكن أن يحدث تلقائياً ، لكنه بطئٌ .

$$2H_2O_2 \xrightarrow{(aq)} 2H_2O + O_2 \xrightarrow{(l)} (g)$$

يمكن الزيادة من سرعة هذا التفاعل إما باستعمال محلول كلورور الحديد III الذي له نفس طور المتفاعلات.

— أو سُلُكَ من البلاطين الذي ليس له نفس طور المتفاعلات.

— أو قطعة صغيرة من الكبد وهي أنزيمات على شكل بروتينات .

**ب) أنواع الحفز:** للحفاز أهمية كبيرة في الرفع من مردودية التفاعل وتفادي المتفاعلات الملوثة للبيئة.

- وهو ثلاثة أنواع:

  - **الحفز المتجانس**: يكون الحفاز منتمياً لطور المتفاعلات.
  - **الحفز الغير متجانس**: لا يكون الحفاز منتمياً لطور المتفاعلات.
  - **الحفز الأذريمي**: يكون الحفاز أذريماً وهو يشتمل على فجوات تعتبر موقع

**فعالة تثبت المتفاعلات وتزيد من سرعة تفاعلهما.**

كما نشير إلى أن انتقائية الحفاز في حالة حدوث عدة تفاعلات خلال نفس التحول الكيميائي يمكن من تسريع أحد المتفاعلات دون غيرها.

**SBIRO ABDELKRIM Lycée Agricole+ lycée Abdellah Cheffchaouni Oulad-Taima region d'agadir  
Maroc**

*Mail* [sbiabdou@yahoo.fr](mailto:sbiabdou@yahoo.fr)

*msen messenger : sbiabdou@yahoo.fr*