

التركيز المولى لأنواع الكيميائية في محلول

I - المحلول المائي النشاط التحرسي 1

- نأخذ ثلاثة كؤوس (1) و(2) و(3) من فئة 250ml .
- الكأس (1) : 200ml من الماء و20g من الساكاروز (السكر العادي) $C_{12}H_{12}O_{11}$.
- الكأس (2) : 200ml من الماء و1g من كلورور الصوديوم $NaCl$.
- الكأس (3) : 200ml من الماء و1g من بلورات كبريتات النحاس II $CuSO_4$.
- 1 – انجز المناولات السابقة . ما اسم الطاهرة المحدثة في كل كأس ؟
 - 2 – ما الدور الذي يلعبه كل من الساكاروز وكلورور الصوديوم وكبريتات النحاس II و الماء ؟
 - 3 – ما هي الأنواع الكيميائية المتواجدة في كل محلول ؟

عند إضافة الساكاروز وبلورات كلورور الصوديوم وكبريتات النحاس II إلى الماء يلاحظ أنها تذوب في الماء فتكون خليطاً متجانساً يسمى محلول المائي . وتسمي هذه الطاهرة الذوبان .

الدور الذي يلعبه كل من الساكاروز وكلورور الصوديوم وكبريتات النحاس II المذاب والماء يلعب دور المذيب يحتوي محلول المائي للساكاروز على جزيئات الساكاروز المذابة $C_{12}H_{12}O_{11}$ وجزيئات الماء H_2O .

خلاصة

- * نسمى محلولاً كل محلول ناتج عن ذوبان مذاب في مذيب .
- * محلول سائل متجانس يحتوي على عدة أنواع كيميائية : جزيئات وأيونات
- * يمكن للمذاب أن يكون في حالة سائلة أو صلبة أو غازية
- * يمكن للمذيب أن يكون ماء أو مركباً عضوياً (كحول – سيكلوكسان)
- * نسمى محلولاً مائياً محلول ناتج عن ذوبان جسم في الماء .

II – التركيز المولى لنوع مذاب في محلول غير منشع

تعريف :

يساوي التركيز المولى لمحلول (أو التركيز المولى للمذاب X) كمية مادة المذاب المتواجدة في لتر واحد من محلول ، وحدته في النظام العالمي للوحدات هي : mol/l ، ويعبر عنه بالعلاقة التالية :

$$C = \frac{n(X)}{V}$$

حجم محلول ب اللتر .

يرمز كذلك إلى التركيز المولى لنوع كيميائي X ب $[X]$.

النشاط التحرسي 2

لتحضير محلول مائي للساكاروز ذي تركيز C_0 نحتاج إلى المعدات التالية : ميزان إلكتروني – حقة – ملوق – حوجلة معيارية من فئة 250ml – مخار مدرج من فئة 200ml – كأس من فئة 250ml – ماصة – لإجاصة مطاطية – ماء مقطر – مسحوق سكر .

المناولة التجريبية

- نضع الحقة فارغة في الميزان ، ونضبط الصفر بواسطة زر العيار .
- بواسطة ملوق نضع كمية من الساكاروز في الحقة ، نقيس $m=50,0g$ من الساكاروز .
- ندخل بواسطة قمع ، كمية من الساكاروز المقاسة ، في الحوجلة المعيارية النظيفة .
- نغسل الحقة والقمع بواسطة الماء المقطر ، حيث يضاف ماء الغسيل إلى الحوجلة المعيارية .
- باستعمال مخار مدرج نملأ ثلثي الوجلة بالماء المقطر .
- نسد فوهة الحوجلة المعيارية ، ونحركها حتى يذوب الساكاروز .
- نضيف الماء المقطر حتى الاقتراب من خط المعيار للحوجلة .
- نضبط بواسطة ماصة مستوى الماء المقطر حتى خط العيار .
- نسد من جديد الحوجلة ، ونحركها بقلبها . نحصل على محلول S_0 للساكاروز .

استثمار التجربة

- 1 – لماذا يجب غسل الحقة والقمع في المرحلة الرابعة ؟
- 2 – فسر لماذا يجب تحريك محلول مع سد فوهة الحوجلة خلال عملية التحرير ؟
- 3 – لماذا يضبط مستوى الماء بواسطة ماصة عند خط المعيار ؟
- 4 – لتكن C_0 تركيز جزيئات الساكاروز في محلول S_0 المحضر . أعط تعبير هذا التركيز . تم احسبه .

الأجوبة

يجب غسل الحقة والقمع حتى تتم إذابة الدفائق الصغيرة من الساكاروز المتبقية في الحقة والقمع .

نحرك محلول لكي تكون هناك إذابة كاملة لجزيئات الساكاروز وسد فوهة الحوجلة يمنع أي ضياع للمحلول ويكون تحضير محلول جد مضمون .

يضبط مستوى الماء بواسطة ماصة عند خط المعيار . استعمال الماصة لكي تكون الإضافة دقيقة جدا وهذا يتطلب التحكم في هذه الإضافة قطرة قطرة حتى لا تتجاوز خط المعيار وفي حالة تجاوزه فقد صلاحية تركيز محلول حساب التركيز المولى لمحلول الساكاروز هو :

$$V = 200ml \text{ مع أن } C_0 = \frac{n(C_{12}H_{12}O_{11})}{V}$$

$$\text{نعلم أن } n(C_{12}H_{12}O_{11}) = \frac{m(C_{12}H_{12}O_{11})}{M(C_{12}H_{12}O_{11})} = \frac{50}{332} = 0,15mol$$

نستنتج التركيز المولى للمحلول هو : $C_0 = 0,75mol/l$ أو نكتب كذلك

$$[C_{12}H_{12}O_{11}] = 7,31 \cdot 10^{-3} mol/l$$

III – تخفيف محلول

1 – تعريف

التخفيف عملية تؤدي إلى التقليل من تركيز المذاب في محلول وذلك بإضافة المذيب . ويلاحظ أنه أثناء هذه العملية تحفظ كمية مادة المذاب .

2 – علاقة التخفيف

لتحضير محلولا ذي تركيز C_f انطلاقا من محلول ذي تركيز C_i ($C_i > C_f$) ، نأخذ حجما V_i من محلول المراد تخفيفه (i) ، ونظيف إليه حجما V_e من الماء المقطر للحصول على الحجم النهائي V_f .

كمية مادة المذاب في الحجم V_i هي : $n_i = C_i V_i$ وكمية مادة المذاب في محلول المخفف هي : $n_f = C_f V_f$ مع أن $V_f = V_i + V_e$. وبما أن كمية مادة المذاب تحفظ خلال عملية التخفيف أي أن $n_i = n_f$ نستنتج أن :

$$C_i V_i = C_f V_f$$


النشاط التجاري 3

لتحضير S_1 محلول مائي مخفف للساكاروز حجمه $V_1=50ml$ ، انطلاقا من محلول S_0 المحضر سابقا ، نحتاج إلى الأدوات المخبرية التالية : محلول S_0 – ماء مقطر – حوجلة معيارية من فئة 50ml – ماصة من فئة 10ml – كأس – إجاصة مطاطية .

المناولة

- نسكب ما يقارب 20ml من محلول S_0 في كأس .
- نأخذ بواسطة ماصة مزودة بإجاصة مطاطية ماصة الحجم $V_0=10ml$ من محلول الموجود في الكأس .
- نسكب الحجم المأخذ ب بواسطة الماصة في الحوجلة المعيارية

– نتمم ملء الحوجلة بالماء المقطر حتى خط المعيار باستعمال الماصة ، تم نسد فوهة



الحوجلة ، ونحركها فنحصل على المحلول المخفف S_1 للساکاروز .
استثمار

- 1 – اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لتحضير المحلول S_1 .
- 2 – أحسب كمية مادة الساکاروز الموجودة في المحلول المقطر $V_0=10\text{ml}$ من المحلول S_0 .
- 3 – ما هو حجم الماء المقطر المضاف للحصول على التركيز C_1 ؟
- 4 – حدد قيمة C_1 التركيز المولى لجزيئات الساکاروز في المحلول S_1 .

الأجوبة :

2 – كمية مادة الساکاروز الموجودة في $V_0=10\text{ml}$ هي :

$$n_i = C_0 V_0 = 0,75 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 7,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

3 – حجم الماء المقطر المضاف : نعلم أن الحجم المحلول المخفف المراد الحصول على هو $V_1 = V_e + V_0 \Rightarrow V_e = V_1 - V_0 = 50 - 10 = 40\text{ml}$

4 – تحديد قيمة C_1

نطبق علاقة التخفيف : $C_1 = \frac{C_0 V_0}{V_1}$ أي أن $C_0 V_0 = C_1 V_1$

تطبيق عددي : $C_1 = 0,03 \text{ mol/l}$

3 – تعريف معامل التخفيف

يمثل المقدار : $\frac{C_i}{C_f}$ معامل التخفيف .

مثال : في النشاط السابق $\frac{C_0}{C_1} = 25$ نقول أنه تم تخفيف المحلول S_0 خمسة وعشرون مرة .

للقيام بتمارين على موقع الأنترنيت ابحث في الموقع التالي :

<http://www.chimix.com/pages/solut1.htm>